

HAMPSHIRE GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES, LLC

10 MAIN STREET, FLORENCE, MA. 01062 (413)586-8910 FAX (413) 584-7270

Practice Limited to Gastroenterology and Liver Disease

JAYA AGRAWAL, MD, MPH • DAVID A. BERKMAN, MD • DAVID KALMAN, MD • JOSEPH P. TASSONI JR, MD
MICHAL GANZ, MD

PREPARACION PARA LA COLONOSCOPIA CON GOLYTELY

SIGA LAS INSTRUCCIONES: Por favor complete la preparación según las indicaciones. Una preparación incompleta puede dar lugar a un examen pobres. Si experimenta vómitos repetidamente (más del doble), por favor tomar un descanso de 30 minutos , beber líquidos calientes , caminar y reanudar lentamente su preparación . También se puede tomar el Compazine si es necesario.

DOS DIAS ANTES DE TU PRUEBA: EVITA VERDURAS CRUDAS, FRUTAS CRUDAS, MAIZ CRUDAS O COCINADA, REMOLACHA, GRANOLA, NUECES Y SEMILLAS, Y GELATINA ROJA.

AL MENOS DOS DÍAS ANTES DE PRUEBA: USTED NECESITA PARA OBTENER LA SIGUIENTE DE SU FARMACIA:

- Cuatro(4) tabletas de 5mg bisacodilo , disponible en el mostrador
- NullLyte / Golyte / Colyte / PEG - 3350- disponibles con receta médica.

UN DIA ANTES:

- **Antes de las 10am un desayuno pequeño** (puedes comer huevos , pan, una taza de café or tea sin leche or crema) tiene que ser café negro.
- **Después de las 10am solamente líquidos claros.** Nada con leche o crema, puedes comer caldo de pollo o carne, gelatina (no rojo o púrpura), Gatorade, soda, popsicle. ** Beba por lo menos 64 onzas de líquidos claros.

* **POR FAVOR EVITAR - líquidos de color rojo y púrpura, lácteos y productos de soja y jugos con pulpa o sedimentos. ****

Ø **A las 2pm**, tomar las (4) pastillas de bisacodyl con 8 onzas de agua o líquidos claros.

Ø **A las 4pm**, comenzar a beber 2 litros de NuLyte / Golyte , por beber 8 onzas cada 10 a 15 minutos . Se puede recorrer en 90 minutos a 2 horas para beber los dos litros. Si el sabor es objetable , sorbo de soda Fresca u otra bebida citrus clara entre bocado y bocado de NuLyte . *Usted tendrá 2 litros que quedan para la dosis de la mañana*

El día de la prueba:

↳ **Antes de tiempo de procedimiento :** beber los dos litros restantes de Golyte (al _____)
Se puede recorrer en 90 minutos a 2 horas para beber los dos litros.

Detenga **todos** los líquidos **4 horas** antes del tiempo de procedimiento (nada después _____)

Por favor de evitar chicle y dulces duros **4 hora** antes del examen.

Instrucciones para diabéticos:

NOTA: Para que este procedimiento se realice, debe tener un paseador en casa. Usted no va a ser dado de alta de la Unidad de Endoscopia a menos que esté acompañado por un adulto responsable que sea lo lleve a casa o que lo acompañe a casa en taxi o autobús.

REPORTAR A: _____ Cooley Dickinson Hospital, Endoscopy Unit (La Entrada de Emergencia)
_____ Valley Medical Group, 31 Hall Drive, Amherst (Ambulatory Surgical Center Main Floor)

No tome Advil o Aleve la mañana de su procedimiento.

FECHA DE PROCEDIMIENTO: _____

PARADA Coumadin en: _____

HORA DE LLEGADA: _____

Nota: La hora de llegada está sujeta a cambios , dependiendo de la CDH / VMG / horario del proveedor. 6/15